

附件 2

关于部分检验项目的说明

（一）尼卡巴嗪

尼卡巴嗪对鸡的多种艾美耳球虫有良好的防治效果，少量的残留不会引起人体急性中毒。但长期大量摄入尼卡巴嗪残留超标的食品，可能在人体内蓄积。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定，尼卡巴嗪在鸡的肌肉、皮+脂中的最大残留限量为 $200\ \mu\text{g/kg}$ 。鸡中尼卡巴嗪残留量超标的原因可能是养殖户在养殖过程中为快速控制球虫病违规加大用药量，也可能是养殖户不遵守休药期规定，致使产品上市销售时残留超标。

（二）甲氧苄啶

甲氧苄啶为抗菌增效剂，常与磺胺类药物一起使用。长期食用甲氧苄啶残留超标的食品，可能会引起恶心、呕吐等反应。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定，甲氧苄啶在鱼的皮+肉中的最大残留限量为 $50\ \mu\text{g/kg}$ 。鱼中甲氧苄啶残留量超标的原因可能是在养殖过程中为快速控制疫病违规加大用药量，也可能是养殖户不遵守休药期规定，致使产品上市销售时残留量超标。