

附件 2

关于部分检验项目的说明

（一）啶虫脒

啶虫脒为内吸性杀虫剂，用于防治半翅目、缨翅目和鳞翅目害虫，叶面或土壤处理。适用作物广泛，特别适用于蔬菜、果树和茶树。少量的残留不会引起人体急性中毒，中毒后会出现恶心、呕吐、头痛、乏力、心跳过速等症状。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021) 中规定，啶虫脒在茄果类蔬菜(番茄、茄子、甜椒、黄秋葵除外)中的最大残留限量值为 0.2mg/kg。啶虫脒残留量超标的原因可能是为快速控制虫害加大用药量，或未遵守采摘间隔期规定，致使上市销售的产品中残留量超标。

（二）柠檬黄

柠檬黄是一种合成着色剂，常用于蜜饯凉果、饮料类配制酒、糖果、风味发酵乳、腌渍蔬菜、果冻、膨化食品等制品。柠檬黄基本无毒，不在体内贮积，绝大部分以原形排出体外，但是如果长期摄入柠檬黄超标的食品，也存在健康风险。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014) 中规定，柠檬黄在肉制品中为不得使用。柠檬黄检测值超标的原因可能是生产者为了改善产品色泽、增加产品的品相而超范围使用。